

“ *Difesa degli ambienti* ”

## CIPERWALL

Insetticida acaricida concentrato in microemulsione acquosa, ad azione abbattente e residuale

**Registrazione Ministeriale:** n. 19768

**Formulazione:** Microemulsione acquosa

### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina 92% 8.7000 g

Tetrametrina 95% 1.6000 g

Piperonil Butossido 4.8000 g

### Caratteristiche:

Il CIPERWALL è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di Cipermetrina, Tetrametrina e di Piperonil Butossido con una triplice azione: abbattente, snidante e residuale.

Il CIPERWALL è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti, trasporto rifiuti, ecc.), industrie alimentari, industrie o di altro genere e in prossimità di aree specifiche quali stalle e allevamenti.

Il CIPERWALL è indicato sia per gli esterni che per gli interni di ambienti domestici: pareti, fessure, pavimenti, lungo gli stipiti delle porte e finestre, sui battiscopa dei pavimenti, cantine, depositi, nei pressi di cucce, ricoveri di cani e gatti. Negli ambienti l'azione insetticida persiste per alcune settimane (4 – 6).

Il trattamento disinfestante può essere esteso su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati solo per la lotta contro le zanzare.

CIPERWALL è attivo su insetti volanti tra cui tafani e mosche (*Musca domestica*), zanzare (*Aedes albopictus*), flebotomi, chironomidi e striscianti tra cui blatte e scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blattella orientalis*), zecche (*Ixodidae*), pulci, cimici dei letti, acari come le zecche (*Ixodidae*).

### Modalità d'impiego:

La soluzione insetticida mediamente va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 10 - 20 mq.

Contro insetti volanti per trattamenti in interni: mosche: diluire 60-80 mL in 10 L di acqua (0.6-0.8 %)

Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: zecche, blatte e scarafaggi: diluire 100 – 150 mL in 10 L di acqua (1 – 1.5 %) - pulci: diluire 50 – 100 mL in 10 L di acqua (0.5 – 1 %)

Contro insetti striscianti per trattamenti esterni: zecche, blatte e scarafaggi: diluire 100-150 mL in 10 L di acqua (1-1.5 %) pulci: diluire 50 – 100 mL in 10 L di acqua (0.5 – 1 %)

Trattamenti all'esterno con atomizzatori: zanzare, chironomidi, flebotomi: diluire 10 – 40 mL in 10 L di acqua (0.1 – 0.4 %)

Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 20 – 60 mL di prodotto in idoneo solvente per 10.000 mq (un ettaro)

### Avvertenze:

Allontanare gli animali durante il trattamento  
areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indicazioni riportate nella modalità d'uso. Il contenitore non può essere riutilizzato. – Per un corretto uso del prodotto attenersi

PMC



scrupolosamente a quanto riportato in etichetta e sulla scheda tecnica. – Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto

**Unità di vendita:**

flacone 1 l  
tanica 5 l

**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

